

RESPOSTA CORRESPONDENTE AO RECURSO 9152

Mantida a resposta devido às bactérias do gênero ENTEROBACTER gram. negativas serem ANAERÓBICAS facultativas, por este motivo NÃO SÃO FREQUENTEMENTE encontradas em culturas de UP ao contrário das demais citadas na referida questão.

Irwin&Rippe, Terapia Intensiva, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.

Geovanini, Telma: Manual de Curativos; São Paulo: Corpus, 2007.

RESPOSTA CORRESPONDENTE AO RECURSO 9153

Mantida a resposta anterior pois segundo Cintra (2011), as principais veias utilizadas para a monitorização da PVC são a braquial, a subclávia e a jugular. Sendo esta a afirmativa correspondente à questão mencionada.

Cintra, Eliane Araújo; Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo, São Paulo, Ed. Atheneu, 2011.

RESPOSTA CORRESPONDENTE AO RECURSO 9154

Mantida a resposta anterior diante da afirmativa de que dentre os sinais QUE NÃO SUGERE isquemia destaca-se a quinta bulha, quando a que sugeria seria a terceira bulha e os demais sinais e sintomas destacados na citada alternativa.

Cintra, Eliane Araújo; Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo, São Paulo, Ed. Atheneu, 2011.