

0.4

PARECER SOBRE RECURSO
QUESTÃO PROVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO II (SAÚDE MENTAL)

Considerando a fundamentação e a argumentação apresentada por Gilvânia Bezerra de Melo, nº inscrição 0204017, sobre a dubiedade de resposta para a questão nº 29 (que em meu arquivo corresponde a questão 4 e que pode ser consultada em anexo), verifico, ao proceder a uma revisão da literatura, que existe a possibilidade de interpretação dúbia. Tal fato decorre da alternativa onde esta grafada a palavra "ANTIDEPRESSIVOS", poder ser interpretada como uma alusão genérica a todos os antidepressivos e não como uma referência a uma classe específica de antidepressivos para os quais a hipotensão ortostática não é listada entre os efeitos colaterais.

Em face desta ocorrência sou de parecer **FAVORÁVEL** a anulação da questão.

Atenciosamente,

Mércia Maria Paiva Gaudencio

São Paulo, 07 de janeiro de 2015

ANEXO

4. Ao observar a instalação de efeitos colaterais em pacientes em uso de medicação psicotrópica e constatar a ocorrência de hipotensão ortostática, o(a) enfermeiro(a) deve associar este sintoma ao uso de:

- a) () Neurolépticos
- b) () Ansiolíticos
- c) () Anticonvulsivantes
- d) () Antidepressivos
- e) () Hipnóticos