

aumento da amplitude torácica promove a melhora da função respiratória e da capacidade funcional desses pacientes.(...)

Fontes:

Livro Manual de Fisioterapia (Neurológica, pediátrica e respiratória) – Módulo II. Editora Mad. 1 Edição. Novembro de 2004. Páginas: 216-17.

Sant CR, Oliveira SG, da Rosa et al. Abordagem fisioterapêutica na doença de Parkinson. RBCEH. Passo Fundo. 2008. Vol. 5, n 1, p 80-89.

\*Memória:

Além dos sintomas físicos os pacientes estão frequentemente deprimidos ansiosos, tendem a ter pouca memória para acontecimentos recentes e podem ter dificuldade para aprender novas tarefas. Com este propósito, o aprendizado pode ser dividido em três funções: aprender a informação, memorizar e evoca-la para utiliza-la. A dificuldade em aprender pode ter um efeito indesejado sobre a fisioterapia, já que se um paciente é incapaz de recordar uma tarefa que já foi ensinado, pode prejudicar-se quando for necessário utilizar a informação desejada. Daí a fisioterapia deve ser trabalhada não só a parte motora como também e conjuntamente com o cognitivo do paciente.

Fonte: Livro Manual de Fisioterapia (Neurológica, pediátrica e respiratória) – Módulo II. Editora Mad. 1 Edição. Novembro de 2004. Páginas: 214-16.

Diante do exposto todas as alternativas são consideradas corretas não havendo gabarito para a questão... assim peço deferimento para anulação da referida questão.

Data:09-02-2015

Assinatura: Kalyanne Simone do Rêgo